

## 26. COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE VESÍCULA EN PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS

La colecistectomía es la extirpación de la vesícula en personas con cálculos vesiculares y de vesículas biliares, principal factor de riesgo del cáncer vesicular en Chile, la cual realizada en forma preventiva disminuye la mortalidad por esta causa.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- I. Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda
- II. Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis
- III. Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis
- IV. Cálculo (impactado) del conducto místico, no especificado o sin colecistitis
- V. Cálculo (impactado) de la vesícula biliar no especificado o sin colecistitis
- VI. Colecistolitiasis no especificada o sin colecistitis
- VII. Colelitiasis no especificada o sin colecistitis
- VIII. Cólico (recurrente) de vesícula biliar no especificado o sin colecistitis
- IX. Cálculo de conducto biliar con colangitis
- X. Cálculo de conducto biliar con cotecistitis
- XI. Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
- XII. Cálculo biliar (impactado) del colédoco, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- XIII. Cálculo biliar (impactado) de conducto biliar sai, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- XIV. Cálculo biliar (impactado) del conducto hepático, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- XV. Colédocolitiasis no especificada o sin colangitis o sin colecistitis
- XVI. Colelitiasis hepática no especificada o sin coliangitis o sin colecistitis
- XVII. Cólico hepático (recurrente) no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- XVIII. Pólipos mayores o iguales de 1 cm

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 26.1. Garantía de acceso:

Todo beneficiario entre 35 y 49 años:

- I. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- II. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 26.2. Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- I. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

Tratamiento

- I. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.

## 26. 3. Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
26	Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 años a 49 años	Diagnóstico	Confirmación colelitiasis	Cada vez	43.030	20 %	8.610
		Tratamiento	Colecistectomía vía laparoscópica	Cada vez	974.570	20 %	194.910
			Colecistectomía abierta	Cada vez	1.116.470	20 %	223.290

